

Cuidado después de su endoscopia o colonoscopia (Care After Your Endoscopy/Colonoscopy)

Pautas generales

- No maneje un auto ni opere maquinaria durante 24 horas después de la prueba.
- No tome decisiones importantes durante las 24 horas después de la prueba.
- Reanude todas sus actividades normales el día posterior a la prueba.
- No beba alcohol durante 24 horas después de la prueba.
- Tylenol es el único medicamento para la fiebre o el dolor que es seguro tomar durante las dos semanas posteriores a la prueba, a menos que se le diga otra cosa.

Complicaciones

Las complicaciones resultantes de estas pruebas son raras, pero pueden incluir:

- Perforación (ruptura de la pared del intestino)
- Sangrado
- Infección
- Reacciones a los medicamentos

Instrucciones sobre la dieta

Su enfermera le asignará y le explicará una de las siguientes dietas:

- ☐ Dieta de líquidos transparentes hoy; se recibieron instrucciones sobre la dieta
- ☐ Dieta completamente de líquidos hoy; se recibieron instrucciones sobre la dieta
- ☐ Dieta con alto contenido de fibras; se recibieron instrucciones sobre la dieta
- ☐ Reanude la dieta general

Resultados

Si le hicieron una biopsia o le extirparon pólipos, recibirá una carta o una llamada telefónica en un plazo de 5 a 7 días en la que le notificarán los resultados. Si no recibe sus resultados en siete días, por favor llame al consultorio de su médico.

Llame a su médico si:

- Tiene un dolor intenso
- Su abdomen (barriga) está dilatado (hinchado) o duro
- Sangra un volumen mayor de media taza
- Tiene una fiebre mayor que 101° F